

## Цисплатин / Іринотекан (локальний протокол) Дрібноклітинний рак легень - ДРЛ

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1, 8        | Іринотекан       | 65                           | 0,9% NaCl | 250 мл          | 90 хвилин    | внутрішньовенно |
| 1, 8        | Цисплатин        | 30                           | 0,9% NaCl | 500 мл          | 1 година     | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Іринотекан</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Цисплатин</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

**Примітка:**

**Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):**

**Супутня медикація:**

**Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.**

**200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.**

**Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.**

**Увага! Іринотекан може викликати небезпечну для життя діарею та холінергічний синдром. Діарея може виникнути або в гострій формі або в деякі дні після введення Іринотекану.**

**Супутня медикація: Атропін 0,2 мг підшкірно або внутрішньовенно**

**У разі діареї: Лоперамід, спочатку 4 мг, потім по 2 мг кожні 2 години. Прийом Лопераміду слід продовжувати ще протягом 12 годин після припинення діареї. Якщо вона триває більш ніж 48 годин або у разі лихоманки, рекомендується призначення Ципрофлоксацину та госпіталізація.**

**Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за мкх-10 - с 33, с 34.**

**Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.**

**Авторство: [Національний інститут раку](#)**

**Література:**

**Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.**

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6**

