хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Карбоплатин / Іринотекан (локальний протокол) Дрібноклітинний рак легень - ДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	Іринотекан	50	0,9% NaCl	250 мл	90 хвилин	внутрішньовенно
1	Карбоплатин	AUC 5	5% Глюкоза	500 мл	30 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Іринотекан																													
	■							■							■														
Карбоплатин																													
	■																												

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:
Розрахунок дози Карбоплатину (формула Calvert):
Доза (мг) = цільова AUC x (ШКФ + 25).
Увага! Іринотекан може викликати небезпечну для життя діарею та холінергічний синдром. Діарея може виникнути або в гострій формі або в деякі дні після введення Іринотекану.
Супутня медикація: Атропін 0,2 мг підшкірно або внутрішньовенно.
У разі діареї: Лоперамід, спочатку 4 мг, потім по 2 мг кожні 2 години. Прийом Лопераміду слід продовжувати ще протягом 12 годин після припинення діареї. Якщо вона триває більш ніж 48 годин або у разі лихоманки, рекомендується призначення Ципрофлоксацину та госпіталізація.
Паспортна частина: нозологія – рак легені; код за мкх-10 – с 33, с 34.
Потенційні користувачі – відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.
Авторство: Національний інститут раку
Література:
Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.