

Бортезоміб ХА020 (європейський протокол) Множинна мієлома

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1, 4, 8, 11 | Бортезоміб | 1,3 | - | 0 | болюс | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Бортезоміб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | ■ | | | | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
8

Примітка:

Бортезоміб також можна вводити підшкірно (концентрація: 2,5 мг/мл).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетная терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Richardson P.G. et al., N Engl J Med 348: 2609, 2003; Moreau P. et al., Lancet Oncol 12: 431ff, 2011.

