

## Цисплатин / Флюороурацил (локальний протокол) Пухлини шлунково-кишкового тракту

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1-5         | Флюороурацил     | 800                          | 0,9% NaCl | 1000 мл         | 24 години    | внутрішньовенно |
| 1           | Цисплатин        | 75                           | 0,9% NaCl | 500 мл          | 2 години     | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Флюороурацил</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Цисплатин</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):

#### Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

