

Цисплатин / Флюороурацил (локальний протокол) Пухлини шлунково-кишкового тракту

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1-5	Флюороурацил	800	0,9% NaCl	1000	24 години	внутрішньовенно
1	Цисплатин	75	0,9% NaCl	500	2 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Флюороурацил																												
■	■	■	■	■																								
Цисплатин																												
■																												

Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6**

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

