

## ESF: Цисплатин / Епірубіцин / Флуороурацил (локальний протокол) Пухлини шлунково-кишкового тракту

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-21	Флуороурацил	200	0,9% NaCl	1000 мл	24 години	внутрішньовенно
1	Цисплатин	60	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно
1	Епірубіцин	50	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Флуороурацил</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					
<b>Епірубіцин</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

**Увага! Епірубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>.**

**Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):**

**Супутня медикація:**

**Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.**

**200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.**

**Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.**

**Авторство: [Національний інститут раку](#)**

