

## Модифікація ЕСФ: Оксаліплатин / Епірубіцин / Флюороурацил (локальний протокол) Пухлини шлунково-кишкового тракту

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник  | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1           | Оксаліплатин     | 130                          | 5% Глюкоза | 500 мл          | 2 години     | внутрішньовенно |
| 1-21        | Флюороурацил     | 200                          | 0,9% NaCl  | 500 мл          | 22 години    | внутрішньовенно |
| 1           | Епірубіцин       | 50                           | 0,9% NaCl  | 250 мл          | 30 хвилин    | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Оксаліплатин</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Флюороурацил</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Епірубіцин</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Увага! Епірубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>.

В якості ад'ювантної терапії, Оксаліплатин призначають у дозі 130 мг/м<sup>2</sup> в першу добу (повторно на 21 добу).

Авторство: [Національний інститут раку](#)

