

Модифікація ЕСФ: Оксаліплатин / Епірубіцин / Флюороурацил (локальний протокол) Пухлини шлунково-кишкового тракту

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Оксаліплатин	130	5% Глюкоза	500 мл	2 години	внутрішньовенно
1-21	Флюороурацил	200	0,9% NaCl	500 мл	22 години	внутрішньовенно
1	Епірубіцин	50	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Оксаліплатин																					
Флюороурацил																					
Епірубіцин																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Увага! Епірубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі ≥ 1000 мг/м².

В якості ад'ювантної терапії, Оксаліплатин призначають у дозі 130 мг/м² в першу добу (повторно на 21 добу).

Авторство: [Національний інститут раку](#)

