

Пегільована ліпосомальна композиція доксорубіцину / Бортезоміб ХС452 + ХА020 (європейський протокол) Множинна мієлома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,4,8,11	Бортезоміб	1,3	-	0	болюс	внутрішньовенно
4	Пегільований ліпосомальний доксорубіцин	30	5% Глюкоза	250 мл	1 годину	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Бортезоміб																												
█			█				█			█																		
Пегільований ліпосомальний доксорубіцин																												
			█																									

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
8

Примітка:

Пегільовану ліпосомальну композицію доксорубіцину розчиняють у 500 мл 5% глюкози, якщо загальна доза перевищує 90 мг.

Бортезоміб також можна вводити підшкірно (концентрація: 2,5 мг/мл).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Orlowski R.Z. et al., J Clin Oncol 25: 3892ff, 2007;

Moreau P. et al., Lancet Oncol 12: 431ff, 2011.

