

## Іфосфамід / Етопозид / Карбоплатин (локальний протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 3, 5	Іфосфамід	1500	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Карбоплатин	350	5% Глюкоза	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1, 3, 5	Етопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Іфосфамід</b>																					
■		■		■																	
<b>Карбоплатин</b>																					
■																					
<b>Етопозид</b>																					
■		■		■																	

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за мкх-10.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

#### Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.

