ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Карфілзоміб / Леналідомід / Дексаметазон XA149 (європейський протокол) Множинна мієлома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22	Дексаметазон	40	-	0	-	перорально
1, 2, 8, 9, 15, 16	Карфілзоміб	20*	5% Глюкоза	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1-21	Леналідомід	25 мг (const)	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:



Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:
Карфілзоміб призначають з початковою дозою 20 мг/м^2 у першому циклі на першу та другу добу. При добрій переносимості дозу збільшують до 27 мг/м^2 на 8-му добу 1 циклу.
До початку 1 циклу необхідна належна гідратація, особливо у пацієнтів з високим ризиком синдрому розпаду пухлини або нефротоксичності.
Рекомендована профілактика утворення тромбів.
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:
Stewart A.K. et al., N Engl J Med 372: 142ff, 2015.