

## Карфілзоміб / Леналідомід / Дексаметазон ХА149 (європейський протокол) Множинна мієлома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22	Дексаметазон	40	-	0	-	перорально
1, 2, 8, 9, 15, 16	Карфілзоміб	20*	5% Глюкоза	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1-21	Леналідомід	25 мг (const)	-	0	-	перорально

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Дексаметазон</b>																												
█							█							█							█							
<b>Карфілзоміб</b>																												
█	█						█	█						█	█													
<b>Леналідомід</b>																												
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
2

#### Примітка:

Карфілзоміб призначають з початковою дозою 20 мг/м<sup>2</sup> у першому циклі на першу та другу добу. При добрій переносимості дозу збільшують до 27 мг/м<sup>2</sup> на 8-му добу 1 циклу.

До початку 1 циклу необхідна належна гідратація, особливо у пацієнтів з високим ризиком синдрому розпаду пухлини або нефротоксичності.

Рекомендована профілактика утворення тромбів.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Stewart A.K. et al., N Engl J Med 372: 142ff, 2015.

