

## Циклофосфамід / Доксорубіцин / Вінкрисдин (локальний протокол) Дрібноклітинний рак легень - ДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Вінкрисдин	2(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1	Доксорубіцин	40	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1, 2	Циклофосфамід	750	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Вінкрисдин</b>																					
<b>Доксорубіцин</b>																					
<b>Циклофосфамід</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за мкх-10.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

#### Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.

