

## Гемцитабін / Цисплатин ХС592 (доба 1), ХС592 (доба 8) (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,8	Гемцитабін	750	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1,8	Цисплатин	30	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Гемцитабін</b>																					
■							■														
<b>Цисплатин</b>																					
■							■														

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):

#### Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

#### Література:

Nagourney RA et al., J Clin Oncol 18: 2245ff, 2000.

