

## Паклітаксел / Цисплатин / Етопозид (локальний протокол) Дрібноклітинний рак легень - ДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Паклітаксел	175	0,9% NaCl	500 мл	3 години	внутрішньовенно
2	Цисплатин	80	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
2 - 4	Етопозид	125	0,9% NaCl	500 мл	2 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Паклітаксел</b>																												
<b>Цисплатин</b>																												
<b>Етопозид</b>																												

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за мкх-10 - с 33, с 34.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

#### Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.

