

## Цисплатин / Паклітаксел (локальний протокол) Рак легень

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Паклітаксел	175	0,9% NaCl	500 мл	3 години	внутрішньовенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Паклітаксел</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					

### Додаткова інформація

**Примітка:**

**Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):**

**Супутня медикація:**

**Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.**

**200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.**

**Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.**

**Паклітаксел розводять до 0,3-1,2 мг/мл.**

**Супутня медикація до Паклітакселю:**

**Премедикація: Дексаметазон, 20 мг внутрішньовенно за 30 хвилин до Паклітакселю або Дексаметазону - 20 мг орально за 12 та за 6 годин до Паклітакселю.**

**Рекомендована додаткова премедикація 50 мг Ранітидину та 30 мг Дифенгідраміну.**

**Розведені розчини Паклітакселю вводять через інфузійні системи без ПВХ.**

**Паспортна частина: нозологія - рак легень; код за мкх-10 - с 33, с 34.**

**Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.**

**Література:**

**Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легень.**

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6**

