

Цисплатин / Паклітаксел (локальний протокол) Рак легень

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Паклітаксел	175	0,9% NaCl	500 мл	3 години	внутрішньовенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Паклітаксел																					
Цисплатин																					

Додаткова інформація

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Паклітаксел розводять до 0,3-1,2 мг/мл.

Супутня медикація до Паклітакселю:

Премедикація: Дексаметазон, 20 мг внутрішньовенно за 30 хвилин до Паклітакселю або Дексаметазону - 20 мг орально за 12 та за 6 годин до Паклітакселю.

Рекомендована додаткова премедикація 50 мг Ранітидину та 30 мг Дифенгідраміну.

Розведені розчини Паклітакселю вводять через інфузійні системи без ПВХ.

Паспортна частина: нозологія - рак легень; код за мкх-10 - с 33, с 34.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легень.

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6**

