

Іксазоміб / Леналідомід / Дексаметазон ХА149 (європейський протокол) Множинна мієлома

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|--------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| 1, 8, 15, 22 | Дексаметазон | 40 | - | 0 | - | перорально |
| 1, 8, 15 | Іксазоміб | 4 (const) | - | 0 | - | перорально |
| 1-21 | Леналідомід | 25 (const) | - | 0 | - | перорально |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Дексаметазон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | | | | | | | █ | | | | | | | █ | | | | | | | █ | | | | | | | |
| Іксазоміб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | | | | | | | █ | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | |
| Леналідомід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:

Іксазоміб зараз також наявний за програмою застосування незареєстрованого препарату при важкій патології.

Рекомендована профілактика утворення тромбів.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Moreau P. et al., Blood 126, 2015 (abstr. 727).

