

# DNAR ± R (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-4	Дексаметазон	40 (const)	-	-	-	внутрішньовенно
1	Цисплатин	100	0,9% NaCl	1000 мл	24 години	внутрішньовенно
2	Цитарабін	4000	0,9% NaCl	500 мл	2 години	внутрішньовенно

## Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Дексаметазон</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					
<b>Цитарабін</b>																					

## Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

### Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

Мета - надання діагностичної та лікувальної допомоги хворим з рецидивом лімфом у Національному інституті раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

