

ДНАОх ± R (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-4	Дексаметазон	40 (const)	-	-	-	внутрішньовенно
1	Оксаліплатин	130	5% Глюкоза	500 мл	3 години	внутрішньовенно
2	Цитарабін	4000	0,9% NaCl	500 мл	2 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Дексаметазон																					
Оксаліплатин																					
Цитарабін																					

Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6**

Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

Мета - надання діагностичної та лікувальної допомоги хворим з рецидивом лімфом у Національному інституті раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

