

ESHAP ± R (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1-4 | Цисплатин | 25 | 0,9% NaCl | 500 мл | 24 години | внутрішньовенно |
| 5 | Цитарабін | 4000 | 0,9% NaCl | 500 мл | 2 години | внутрішньовенно |
| 1-4 | Етопозид | 60 | 0,9% NaCl | 500 мл | 2 години | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Цисплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цитарабін | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Етопозид | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

Мета - надання діагностичної та лікувальної допомоги хворим з рецидивом лімфом у Національному інституті раку.

Важливо - обов'язкове введення Метилпреднізалон 500 мг, в/венно - день 1-4.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

