

ESHAP ± R (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1-4	Цисплатин	25	0,9% NaCl	500	24 години	внутрішньовенно
5	Цитарабін	4000	0,9% NaCl	500	2 години	внутрішньовенно
1-4	Етопозид	60	0,9% NaCl	500	2 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Цисплатин																					
■	■	■	■																		
Цитарабін																					
				■																	
Етопозид																					
■	■	■	■																		

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

Мета - надання діагностичної та лікувальної допомоги хворим з рецидивом лімфом у Національному інституті раку.

Важливо - обов'язкове введення

Метилпреднізалон 500 мг, в/венно - день 1-4.

