

MINE ± R (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1-3	Іфосфамід	1330	0,9% NaCl	500	24 години	внутрішньовенно
1-3	Месна	1330	0,9% NaCl	500	24 години	внутрішньовенно
1	Мітоксантрон	8	0,9% NaCl	100	2 години	внутрішньовенно
1-3	Етопозид	65	0,9% NaCl	500	1 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Іфосфамід																					
Месна																					
Мітоксантрон																					
Етопозид																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

Мета - надання діагностичної та лікувальної допомоги хворим з рецидивом лімфом у Національному інституті раку.

Важливо - Месна вводиться за схемою, потім 500 мг/сут в/венно, починаючи через 4 години після закінчення інфузії Іфосфаміду, 1-3 день.

