ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Карбоплатин / Паклітаксел + Бевацизумаб XC772 + XA060 Рак яєчника

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутрішньовенно
1	Паклітаксел	175	0,9% NaCl	500 мл	3 часа	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Карбоплатин																						
Паклітаксел																						

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:
Пацитаксел розводять до 0,3-1,2 мг/мл.
Розрахунок дози Карбоплатину (формула Calvert):
Доза (мг) = цільова AUC x (ШКФ + 25).
(*) Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хв. У разі гарної переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.
Розведені розчини Паклитакселю вводять через інфузійні системи без ПВХ.
Література:
Burger et al., N Engl J Med 365: 2473ff, 2011.