хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

GVP ± R (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,8	Вінорельбін	30	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1,8	Гемцитабін	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1-8	Преднізолон	100 мг (const)	-	-	-	перорально

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Вінорельбін	■							■														
Гемцитабін	■							■														
Преднізолон	■	■	■	■	■	■	■	■														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:
Нозологія – рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.
Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.
Авторство: Національний інститут раку