

## GVP ± R (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,8	Вінорельбін	30	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1,8	Гемцитабін	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1-8	Преднізолон	100 мг (const)	-	-	-	перорально

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Вінорельбін</b>																					
■							■														
<b>Гемцитабін</b>																					
■							■														
<b>Преднізолон</b>																					
■	■	■	■	■	■	■	■														

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

