

IVEG ± R (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1	Вінорельбін	20	0,9% NaCl	100	10 хвилин	внутрішньовенно
1,4	Гемцитабін	800	0,9% NaCl	250	30 хвилин	внутрішньовенно
1-4	Іфосфамід	2000	0,9% NaCl	500	1 година	внутрішньовенно
1-4	Преднізолон	100 мг (const)	-	-	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Вінорельбін																					
■																					
Гемцитабін																					
■			■																		
Іфосфамід																					
■	■	■	■																		
Преднізолон																					
■	■	■	■																		

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

Важливо - Месна (Mesna) 20% дози Іфосфаміду, через 0, 4 - 8 год. після прийому Іфосфаміду.

