

# GemOx ± R (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник  | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1           | Гемцитабін       | 1000                         | 0,9% NaCl  | 250 мл          | 30 хвилин    | внутрішньовенно |
| 1           | Оксаліплатин     | 100                          | 5% Глюкоза | 500 мл          | 2 години     | внутрішньовенно |

## Графік введення препаратів:

| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| <b>Гемцитабін</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| <b>Оксаліплатин</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

## Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
15 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

### Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

