

## РЕР-С (локальний протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-30	Преднізолон	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Прокарбазин	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Циклофосфамід	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Етопозид	50 мг (const)	-	-	-	перорально

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Преднізолон</b>																														
[Графік: 31 заповнений день]																														
<b>Прокарбазин</b>																														
[Графік: 31 заповнений день]																														
<b>Циклофосфамід</b>																														
[Графік: 31 заповнений день]																														
<b>Етопозид</b>																														
[Графік: 31 заповнений день]																														

### Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:  
31 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
постійний прийом**

#### Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

**Важливо - препарати приймаються постійно під контролем гемограми щотижня. При рівні лейкоцитів  $<3.0 \cdot 10^9 / л$  - припинення терапії до відновлення рівню лейкоцитів.**

Авторство: [Національний інститут раку](#)

