хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

PEP-C (локальний протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-30	Преднізолон	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Прокарбазин	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Циклофосфамід	50 мг (const)	-	-	-	перорально
1-30	Етопозид	50 мг (const)	-	-	-	перорально

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Преднізолон																															
Прокарбазин																															
Циклофосфамід																															
Етопозид																															

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
31 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
постійний прийом

Примітка:
Нозологія – рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.
Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.
Важливо – *препарати приймаються постійно під контролем гемограми щотижня. При рівні лейкоцитів <3.0*10^9/л – припинення терапії до відновлення рівню лейкоцитів.*
Авторство: Національний інститут раку