

# Вінбластин (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1           | Вінбластин       | 10 мг (const)                | 0,9% NaCl | 100 мл          | 10 хвилин    | внутрішньовенно |

## Графік введення препаратів:

| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Вінбластин</b> |   |   |   |   |   |   |   |
|                   |   |   |   |   |   |   |   |

## Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
8 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
10

### Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

**Важливо - препарат приймають постійно під контролем гемограми щотижня. При рівні лейкоцитів  $<3.0 \cdot 10^9/\text{л}$  - припинення терапії до відновлення рівню лейкоцитів.**

Авторство: [Національний інститут раку](#)

