

Вінбластин (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | Вінбластин | 10 мг (const) | 0,9% NaCl | 100 мл | 10 хвилин | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінбластин | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
8 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
10

Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

Важливо - препарат приймають постійно під контролем гемограми щотижня. При рівні лейкоцитів $<3.0 \cdot 10^9/\text{л}$ - припинення терапії до відновлення рівню лейкоцитів.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

