

## СЕРР(В) (локальний протокол) Ходжкінська лімфома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,15	Блеоміцин	15	-	-	болюсно	внутрішньовенно
1-10	Преднізолон	60	-	-	-	перорально
1-10	Прокарбазин	60	-	-	-	перорально
1,8	Циклофосфамід	600	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1-3	Етопозид	70	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Блеоміцин</b>																					
█															█						
<b>Преднізолон</b>																					
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█											
<b>Прокарбазин</b>																					
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
<b>Циклофосфамід</b>																					
█							█														
<b>Етопозид</b>																					
█	█	█																			

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Нозологія - рецидив лімфоми Ходжкіна, неходжкінських лімфом.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку.

Важливо - Месна (Mesna) 20% дози Циклофосфаміду, через 0, 4 та 8 год. після прийому Циклофосфаміду.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

