

## Помалідомід / Дексаметазон ХА149 (європейський протокол) Множинна мієлома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22	Дексаметазон	40 (const)	-	0	-	перорально
1-21	Помалідомід	4 (const)	-	0	-	перорально

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Дексаметазон</b>																												
<b>Помалідомід</b>																												

### Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
2**

#### Примітка:

Рекомендована профілактика утворення тромбів.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хімотерапії 2016.

Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

San-Miguel J.F. et al., *Lancet Oncol* 14: 1055ff, 2013.

