

MVP з цитарабіном (локальний протокол) Лімфома ЦНС

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Вінкрисдин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1	Метотрексат	2500	0,9% NaCl	100 мл	15 хвилин	внутрішньовенно
1-5	Прокарбазин	150	-	-	-	перорально
1,2	Цитарабін	3000	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вінкрисдин														
Метотрексат														
Прокарбазин														
Цитарабін														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
15 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
5

Примітка:

Первинна В-великоклітинна лімфома ЦНС у відповідності з класифікацією ВООЗ-2008.

Протокол призначений для відділення онкогематології з групою ад'ювантних методів лікування, відділення променевої терапії Національного інституту раку з метою надання лікувальної допомоги хворим на Первинну В-великоклітинну лімфому ЦНС в Національному інституті раку.

Важливо - через 24 години після завершення основного циклу або променевої терапії призначають Метотрексат ендоліумбально, вводиться у вільні тижні.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

