

Паклітаксел / Карбоплатин / Флюороурацил (локальний протокол) Рак голови та шиї

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Паклітаксел	175	0,9% NaCl	500 мл	3 години	внутрішньовенно
3-5	Флюороурацил	1000	0,9% NaCl	1000 мл	24 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Карбоплатин																					
Паклітаксел																					
Флюороурацил																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
5

Примітка:

Локальний протокол медичної допомоги хворих на:

- рак губи;
- рак ротової порожнини;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхньощелепної пазухи;
- рак слинних залоз.

Протокол призначений для відділення пухлин голови та шиї, відділення променевої терапії та відділення хіміотерапії солідних пухлин

Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

