

## Паклітаксел / Карбоплатин / Флюороурацил (локальний протокол) Рак голови та шиї

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500	1 година	внутрішньовенно
1	Паклітаксел	175	0,9% NaCl	500	3 години	внутрішньовенно
3-5	Флюороурацил	1000	0,9% NaCl	1000	24 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Карбоплатин</b>																					
<b>Паклітаксел</b>																					
<b>Флюороурацил</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
5

#### Примітка:

Локальний протокол медичної допомоги хворих на:

- рак губи;
- рак ротової порожнини;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхньощелепної пазухи;
- рак слинних залоз.

Протокол призначений для відділення пухлин голови та шиї, відділення променевої терапії та відділення хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку.

