

Метотрексат / Блеоміцин / Цисплатин (локальний протокол) Рак голови та шиї

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	Блеоміцин	10	-	-	болюс	внутрішньовенно
1, 15	Метотрексат	40	0,9% NaCl	100 мл	15 хвилин	внутрішньовенно
1	Цисплатин	50	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Блеоміцин																					
█							█							█							
Метотрексат																					
█														█							
Цисплатин																					
█																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
5

Примітка:

Локальний протокол медичної допомоги хворих на:

- рак губи;
- рак ротової порожнини;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхньощелепної пазухи;
- рак слинних залоз.

Протокол призначений для відділення пухлин голови та шиї, відділення променевої терапії та відділення хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку.

Важливо! Проводиться при низько- та недиференційованих формах раку, рецидивуючого та/або метастазуючого раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

