

## Метотрексат / Блеоміцин / Цисплатин (локальний протокол) Рак голови та шиї

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	Блеоміцин	10	-	-	болюс	внутрішньовенно
1, 15	Метотрексат	40	0,9% NaCl	100 мл	15 хвилин	внутрішньовенно
1	Цисплатин	50	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Блеоміцин</b>																					
█							█							█							
<b>Метотрексат</b>																					
█														█							
<b>Цисплатин</b>																					
█																					

### Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
5**

#### Примітка:

Локальний протокол медичної допомоги хворих на:

- рак губи;
- рак ротової порожнини;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхньощелепної пазухи;
- рак слинних залоз.

Протокол призначений для відділення пухлин голови та шиї, відділення променевої терапії та відділення хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку.

**Важливо!** Проводиться при низько- та недиференційованих формах раку, рецидивуючого та/або метастазуючого раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

