

Циклофосфамід / Блеоміцин / Вінбластин / Карбоплатин (локальний протокол) Рак голови та шиї

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-3	Блеоміцин	30	-	-	болус	внутрішньовенно
1	Вінбластин	6	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
4	Карбоплатин	AUC 5	5% Глюкоза	500 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	800	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Блеоміцин																					
Вінбластин																					
Карбоплатин																					
Циклофосфамід																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
5

Примітка:

Локальний протокол медичної допомоги хворих на:

- рак губи;
- рак ротової порожнини;
- рак ротоглотки;
- рак носоглотки;
- рак верхньощелепної пазухи;
- рак слинних залоз.

Протокол призначений для відділення пухлин голови та шиї, відділення променевої терапії та відділення хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку.

Важливо! Протокол проводиться при низько- та недиференційованих формах раку.

Месна (Mesna) 20% дози Циклофосфаміду, через 0, 4 та 8 год. після прийому Циклофосфаміду.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

