хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Циклофосфамід / Блеоміцин / Вінбластин / Карбоплатин (локальний протокол) Рак голови та шиї

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-3	Блеоміцин	30	-	-	болюс	внутрішньовенно
1	Вінбластин	6	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
4	Карбоплатин	AUC 5	5% Глюкоза	500 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	800	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Блеоміцин																						
Вінбластин																						
Карбоплатин																						
Циклофосфамід																						

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
5

Примітка:
Локальний протокол медичної допомоги хворих на:
• рак губи;
• рак ротової порожнини;
• рак ротоглотки;
• рак носоглотки;
• рак верхньощелепної пазухи;
• рак слинних залоз.
Протокол призначений для відділення пухлин голови та шиї, відділення променевої терапії та відділення хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку.
Важливо! Протокол проводиться при низько- та недиференційованих формах раку.
Месна (Mesna) 20% дози Циклофосфаміду, через 0, 4 та 8 год. після прийому Циклофосфаміду.
Авторство: Національний інститут раку