

5FU / Лейковорин / Оксаліплатин (FOLFOX IV) + Панітумумаб ХС588 + ХА080 (європейський протокол) Колоректальний рак

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-2	Кальцію фолінат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутрішньовенно
1, 15	Оксаліплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутрішньовенно
1, 15	Панітумумаб	6 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	1 час	внутрішньовенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	600	0,9% NaCl	500 мл	22 часа	внутрішньовенно
1, 2, 15, 16	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Кальцію фолінат																												
█	█																											
Оксаліплатин																												
															█													
Панітумумаб																												
															█													
Флюороурацил																												
█	█														█	█												
Флюороурацил																												
█	█														█	█												

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

5FU можна вводити за допомогою інфузійного насоса амбулаторно.

Панітумумаб >1000 мг розчиняють у 150 мл 0,9% розчину NaCl та вводять протягом 90 хвилин.

У разі гарної переносимості, наступні дози можна вводити протягом 30 хвилин.

Література:

Douillard J.Y. et al., J Clin Oncol 28: 4697ff, 2010.

