

СНОР + Ритуксимаб ХС264 + ХА090 (європейський протокол) НХЛ гостра

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Вінкрестин	1,4(*)	0,9% NaCl	500 мл	1 годину	внутрішньовенно
1	Доксорубіцин	50	0,9% NaCl	250 мл	1 годину	внутрішньовенно
1	Преднізон	40	-	0	10 хвилин	перорально
1-5	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500 мл	-	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	750	0,9% NaCl	500 мл	5 годин (3 години)	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Вінкрестин																					
Доксорубіцин																					
Преднізон																					
Ритуксимаб																					
Циклофосфамід																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:

Ритуксимаб: Початкова швидкість інфузій - 50 мг/год; через 30 хвилин її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Подальші дози вводяться на початковій швидкості 100 мг/год та збільшуються на 100 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Рекоменується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну.

(*) Вінкрестин, макс. 2 мг.

Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз ≥ 500 мг/м².

Месна: 20% дози Циклофосфаміду через 0, 4, 8 год. після прийому Циклофосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

Література:

Coiffier B. et al., N Engl J Med 346: 235ff, 2002.

