хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Гідроксиуреа ХА149 (європейський протокол) Хронічна мієлоїдна лейкемія

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-30	Гідроксикарбамід	40 мг/кг	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Гідроксикарбамід																															

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
31 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
постійний прийом

Повторно: * Постійний прийом.
Примітка:
Коригування дози в залежності від реакції.
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:
Hehlmann R. et al., Blood 84: 4064ff, 1994.