

Гідроксиуреа ХА149 (європейський протокол) Інші хронічні мієлопроліферативні захворювання

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-30	Гідроксикарбамід	15 мг/кг	-	0	-	перорально
1-30	Гідроксикарбамід 2	15 мг/кг	-	30 шт	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Гідроксикарбамід																														
Гідроксикарбамід 2																														

Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:
31 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
постійний прийом**

Повторно: * Постійний прийом.

Примітка:

Коригування дози в залежності від реакції.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016.

Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Cortelazzo S. et al., N Engl J Med 332: 1132ff, 1995.

