

## Анагрелід ХА149 (європейський протокол) Інші хронічні мієлопроліферативні захворювання

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-30	Анагрелід	4 x 0,5 (const)	-	0	-	перорально

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Анагрелід																														
[Графік показує заповнені клітинки для препаратів Анагрелід з 1 по 30 день]																														

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
31 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
постійний прийом

#### Примітка:

Повторно: \* Постоянный прием.

Розпочинають терапію з 0,5 мг/д протягом тижня, після чого дозу збільшують щотижня на 0,5 мг/д до досягнення бажаного терапевтичного ефекту. Загальна встановлена доза на добу розподіляється на 2х (кожні 12 год.) або 3х (кожні 8 год.).

Препарат з дозуванням, що перевищує 5 мг/д не застосовується.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Petitt R.M. et al., Semin Hematol 34: 51ff, 1997.

