

## Руксолітиніб ХА149 (європейський протокол) Інші хронічні мієлопроліферативні захворювання

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-30	Руксолітиніб	2 x 15* (const)	-	0	-	перорально

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Руксолітиніб																														
█																														

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
31 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
постійний прийом

Повторно: \* Постійний прийом.

Примітка:

Початкова доза Руксолітинібу - по 15 мг, орально два рази на добу пацієнтам з кількістю тромбоцитів 100-200 г/л та по 20 мг два рази на добу пацієнтам з кількістю тромбоцитів >200 г/л. Пацієнтам з кількістю тромбоцитів 50-100 г/л прийом розпочинають з 5 мг два рази на добу.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016.

Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Verstovsek S. et al., N Engl J Med 366: 799ff, 2012.

