

**Цисплатин / Вінорелбін / Цетуксимаб ХС336 (доба 1) +  
ХА070; ХС884 (доба 8) + ХА070; ХА070 (доба 15)  
(європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень -  
НДРЛ**

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8	Вінорельбін	25	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1, 8, 15	Цетуксимаб	250	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно

**Графік введення препаратів:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Вінорельбін</b>																					
■							■														
<b>Цетуксимаб</b>																					
■							■							■							
<b>Цисплатин</b>																					
■																					

**Додаткова інформація**

**Примітка:**

Вінорелбін вводиться швидко внутрішньовенно.

(Увага! Тромбофлебіт; загроза некрозу після екстравазації, тому бажане застосування катетера "Port-A-Cath").

Після чого 250 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно.

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

(\*) Цетуксимаб: Перше введення - протягом 120 хвилин у дозі 400 мг/м<sup>2</sup> до початку хіміотерапії. Відповідно до протоколу досліджень, прийом Цетуксимабу продовжується після завершення хіміотерапії протягом перебігу захворювання або настання неприпустимої токсичності.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Pirker R. et al., Lancet 373: 1525ff, 2009.

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

