

## Вінорелбін (перорально) ХА149 (європейський протокол) - Частина 2 Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Вінорельбін	80	-	0	-	перорально

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8
Вінорельбін							

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
8 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
1

#### Примітка:

Призначення цієї схеми можливо тільки після проходження схеми - Вінорелбін (перорально) ХА149 (європейський протокол) - Частина 1. У разі нейтропенії (один раз при 4 ступені за ВООЗ або два рази при ступені 3 за ВООЗ):

- Протягом перших трьох тижнів після початку лікування зберігати дозу 60 мг/м<sup>2</sup>/тиждень.
- (\*) Протягом наступних тижнів знижувати дозу з 80 мг/м<sup>2</sup>/тиждень до 60 мг/м<sup>2</sup>/тиждень.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

#### Література:

Jassem J. et al., Ann Oncol 12: 1375ff, 2001.

