

НАВ-паклітаксел / Карбоплатин ХС774 (європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1, 8, 15 | НАВ-паклітаксел | 100 | - | 0 | 30 хвилин | внутрішньовенно |
| 1 | Карбоплатин | AUC 6 | 5% Глюкоза | 500 мл | 1 година | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| НАВ-паклітаксел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| Карбоплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Розрахунок дози Карбоплатину (формула Calvert):

Доза (мг) = цільова AUC x (ШКФ + 25).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Socinski M.A. et al., J Clin Oncol 30: 2055ff, 2012.

